BỆNH VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN THÁI NGUYÊN

KHOA DƯỢC - CẬN LÂM SÀNG

BẢN TIN

THÔNG TIN THUỐC LƯU HÀNH NỘI BỘ

NỘI DUNG THÔNG TIN DƯỢC LÂM SÀNG:

THUỐC: KIỆN HUYẾT ÍCH NÃO (VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG)

THÁI NGUYÊN, NĂM 2026

DẠNG BÀO CHẾ: VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG

KIỆN HUYẾT ÍCH NÃO

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

▪ MÔ TẢ	Viên nén bao đường màu đen hoặc nâu đen, hình trụ, một viên lồi, không nứt vỡ, không sứt mẻ, mùi thơm dược liệu.
▪ THÀNH PHẦN (CHO 1 VIÊN)	* **Thành phần hoạt chất:** Cao đặc rễ Đinh lăng 5:1 (Extractum Radix Polysclacis spissum)..... 150 mg *(Tương đương 750 mg rễ Đinh lăng)* Cao khô lá Bạch quả (Extractum Folii Ginkgo siccus)..... 5 mg *(Hàm lượng flavonoid toàn phần ≥ 24 %)* * **Thành phần tá dược:** Đường trắng, Lactose, Tinh bột, Calci carbonat, Magnesi stearat, bột Talc, Erythrosin lake, Gelatin, Povidone, Than hoạt, Methylparaben, Propylparaben, Parafin..... vừa đủ.
▪ DẠNG BÀO CHẾ	Viên nén bao đường.
▪ CHỈ ĐỊNH	- Phòng và điều trị cho các trường hợp sau: + Suy giảm trí nhớ, thiểu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình. + Suy tuần hoàn não: đau đầu, mất ngủ, mất thăng bằng. + Giảm chức năng não bộ: suy nhược thần kinh, di chứng não...

	+ Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi ở người làm việc trí óc căng thẳng.
▪ LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG	* Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống 2 - 3 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày. * Trẻ em từ 4 - 12 tuổi: uống 1 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày. Thời gian sử dụng: 2 - 3 tháng hoặc lâu hơn tùy theo tình trạng bệnh.
▪ CHỐNG CHỈ ĐỊNH	- Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. - Phụ nữ có thai. - Người có rối loạn về máu, rong kinh, đa kinh, người đang xuất huyết. - Người bị bệnh đái tháo đường.
▪ CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG	Sản phẩm chứa: - Lactose và đường: nên liên hệ bác sĩ trước khi dùng thuốc nếu mắc chứng không dung nạp đường. - Methylparaben và propylparaben: có thể gây phản ứng dị ứng (có thể là phản ứng muộn).
▪ PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ	- Không dùng cho phụ nữ có thai. - Dùng được cho phụ nữ đang cho con bú.
▪ LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC	Không ảnh hưởng.
▪ TƯƠNG TÁC THUỐC	Không dùng với các thuốc chỉ huyết.
▪ TÁC DỤNG KHÔNG	Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

MONG MUỐN	*Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.*
▪ QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ	- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. - Khi dùng thuốc quá liều, tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.
▪ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI	Hộp 1 vỉ, 5 vỉ x 20 viên nén bao đường.
▪ BẢO QUẢN & HẠN DÙNG	**Bảo quản:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng. **Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TRƯỞNG KHOA DƯỢC - CẬN LÂM SÀNG

PHAN THỊ KIM NGÂN